

4

Comunicato Per La Difesa In Viticoltura
Difesa Integrata Volontaria VITE

4

VINCOLATA AL QUADRO DELLE NORME TECNICHE DELLA MISURA 10.1.1 DEL PSR

CentroAssistenzaTecnica LANGHE ROERO DOGLIANI MONREGALESE
2021 Del 28 Maggio ore 7,3 2021

Situazione

Prosegue un regime pluviometrico primaverile scarso. L'annata presenta indici termici tra i più bassi (se non in assoluto) dal 2000. Esordi timidi di fioritura nelle zone/vitigni più avanzati. L'inizio cospicuo della stessa è atteso da metà/ fine settimana prossima a seconda delle zone/vitigni con 14-16 gg di ritardo rispetto all'anno scorso. In settimana segnalata comparsa di macchie d'olio di peronospora più diffuse (comunque estremamente limitate) rispetto alle prime segnalazioni isolate all'inizio della seconda decade del mese. Domenica possibili temporali isolati.

PERONOSPORA. Plasmopara viticola.

SI CONSIGLIA DI REINTERVENIRE A 9-10 GIORNI DI DISTANZA DAL PRECEDENTE TRATTAMENTO

CHIUDENDO L'INTERVENTO TRA SABATO 29-LUNEDI 31 MAGGIO UTILIZZARE FORMULATI COMMERCIALI CONTENENTI:

***FAMIGLIA/GRUPPO: COPERTURA** (4 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO) : MANCOZEB (3 TRATT. MAX FINO ALLEGAGIONE), DITHIANON (3 TRATT. MAX FINO ALLEGAGIONE), FLUAZINAM (3 TRATT. MAX) FOLPET (3 TRATT. MAX). METIRAM(3 TRATT. MAX SE DA SOLO, FINO ALL'ALLEGAGIONE). **IN ASSOCIAZIONE A :** **INDUTTORI SISTEMICI** (8 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO): FOSETYL AL(SL); FOSFONATO DI POTASSIO(5MAX), FOSFONATO DI DISODIO (6MAX). **OPPURE A AMETOCTRADINA** (QoSi) (3 TRATT/MAX) **OPPURE A FLUOPICOLIDE**(2 TRATT/MAX) **OPPURE A *FAMIGLIA/GRUPPO: Qil** (3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO) : AMISULBROM (3MAX), CIAZOFAMIDE+ (3MAX) **OPPURE A *FAMIGLIA/GRUPPO: FENILAMMIDI** (3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO) : BENALAXYL (3MAX).BENALAXYL-M (3MAX).METALAXYL-M (3MAX).

OIDIO. Uncinula necator.

in pre.fioritura (salvo situazioni più a rischio per attacchi negli anni precedenti) utilizzare formulati commerciali a base di Zolfo.

Esclusivamente nei siti più precoci In alternativa è possibile ricorrere a : ***FAMIGLIA/GRUPPO: IBE** (3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO) :

FLUTRIAFOL-MICLOBUTANIL-DIFEN/TEBU/CONAZOLO (TUTTI 1 trattamento/MASSIMO/ANNO). oppure * FENBU/PEN/ TETRA-CONAZOLO (TUTTI 3 TRATTAMENTI/MAX/ANNO). L'ASSOCIAZIONE DI ZOLFO BAGNABILE A QUEST'ULTIMI (SE NON GIÀ FORMULATI CON ESSO) È COMUNQUE UTILE E CONSIGLIATA IN CHIAVE ANTIRESISTENZA. oppure: CILFUFENAMID(2 TRATT/MAX) O MEPTILDINOCAP(2 TRATT/MAX) O SPIROXAMINA (3 TRATT/MAX O FLUXAPIROXAD (2 MAX)

ATTENZIONE ESTREMA. TUTELA APISTICA : La Legge Regionale n. 1/2019, articolo 96, comma 9, prevede:

“Al fine di tutelare gli allevamenti apistici da sostanze tossiche, **sono vietati i trattamenti**

antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api ... durante il periodo di fioritura, Trattamenti altresì se sono presenti secrezioni nettariifere extrafloriali su piante

con presenza di melata o qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, tranne che si sia proceduto allo sfalcio di queste ultime ed all'asportazione totale delle loro masse, o si sia atteso

che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api”. PERTANTO OCCORRE VERIFICARE ATTENTAMENTE EVENTUALI INDICAZIONI DI TOSSICITA' IN MERITO RIPORTATE IN ETICHETTA***

ATTENZIONE ALLA NUOVA DICITURA RIPORTATA NELLA PARTE GENERALE DELLE NORME TECNICHE DI DIFESA VITE:

Nelle miscele estemporanee di fungicidi (compreso combi pack) non sono impiegabili più di due sostanze attive diverse contemporaneamente per ciascuna avversità. Da questa limitazione vanno esclusi i prodotti rameici, lo zolfo, i Fosfonati di K, il Fosfonato di disodio, il Fosetil Al e tutti i prodotti biologici.

CONSULTARE IL PROPRIO TECNICO PER ULTERIORI VALUTAZIONI

*** QUI UNA PREZIOSA FONTE CONSULTABILE di base
<https://www.informamiele.it/Tabella-tossicita>